



ROE
LABORATORIO
CLÍNICO



Vacunas

La mejor forma de
prevenir enfermedades

Vacunas para adultos

Fiebre Amarilla

Vacuna: Virus vivo atenuado, cepa D-17.

Dosis: 1 dosis.

Tiempo de protección: De por vida.

Recomendación: Evitar embarazo hasta un mes después de la vacunación. Mayores de 60 años, visitar previamente a un médico especialista para que le indique la vacunación si así lo considere.

Hepatitis Viral A

Vacuna: virus de hepatitis A de la cepa GBM, inactivada.

Dosis: 2 dosis.

Esquema: Día de inicio - 6 meses.

Hepatitis Viral B

Vacuna: ADN recombinante.

Dosis: 3 dosis.

Esquema: Día de inicio - 1 mes - 6 meses.

Hepatitis Viral A y B (Doble)

Vacuna: Combinación del virus de la Hepatitis A inactivado y purificado, y el antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B purificado.

Dosis: 3 dosis.

Indicado: A todas las personas que no hayan padecido la enfermedad.

Esquema: Día de inicio - 1 mes - 6 meses.

Rubéola - Paperas - Sarampión

Vacuna: Virus vivo atenuado.

Dosis: 2 dosis.

Esquema: Día de inicio - 1 mes.

Tiempo de protección: Más de 10 años.

Contraindicación: Embarazadas.

Recomendación: Evitar el embarazo entre 1 a 3 meses después de la vacunación.

Poliomielitis IPV

Vacuna: Polivalente, inactivada

Dosis: 1 dosis.

Esquema: Día de inicio.

Tiempo de protección: Más de 10 años.

Difteria, Tétanos, Pertusis Acelular (DTPa)

Vacuna: Triple bacteriana, toxoide antitetánico, antidiftérico y antipertúsico acelular adsorbido en hidróxido de aluminio.

Dosis: 1 dosis.

Tiempo de protección: 10 años.

**Importante la vacunación en embarazadas desde las 27 a las 36 semanas de gestación (NTS 141 MINSA) y entorno familiar cercano para prevenir la tos convulsiva en el recién nacido.*

Fiebre Tifoidea

Vacuna: Polisacárido capsular Vi purificado de Salmonella Typhi.

Dosis: 1 dosis.

Tiempo de protección: 2 o 3 años.

Difteria - Tétanos

Vacuna: Toxoide diftérico y tetánico adsorbido en hidróxido de aluminio.

Dosis: 3 dosis (Personas que perdieron la regularidad de su cronograma de vacunaciones).

***como refuerzo:** 1 dosis.

Esquema: Día de inicio - 1 mes - 7 meses.

Tiempo de protección: 10 años.

Meningitis Meningocócica

Vacuna: Polisacárida conjugada tetravalente: serotipos A+C+Y+W.

Dosis: 1 dosis en pacientes sin riesgo, 2 dosis en pacientes de riesgo.

Tiempo de protección: 5 años en pacientes de riesgo.

Varicela

Vacuna: Virus vivo atenuado.

Dosis: 2 dosis en mayores de 10 años.

Esquema: Día de inicio - 2da dosis: 1 a 2 meses después.

Tiempo de protección: Indeterminado.

Recomendación: Evitar el embarazo de 1 a 3 meses después de la vacunación.

Influenza Estacional

Vacuna Tetravalente (Protege contra 4 serotipos del virus de la influenza: dos del tipo A y dos del tipo B) elaborado con: Virus muerto fraccionado por ruptura del lípido y membrana.

Tiempo de protección: 1 año (Es recomendable la vacuna en otoño para mantener la protección durante el año).

Rabia

Vacuna: Virus inactivado, purificado y liofilizado.

Esquema pre exposición: 3 dosis.

Cronograma: Día de inicio - día 7 - día 28, un refuerzo al año y luego cada 5 años.

Esquema de post-exposición: 5 dosis.

Cronograma: Día de inicio - día 3 - día 7 - día 14 - día 28, un refuerzo al año, en adelante 1 dosis cada 5 años.

Virus del Papiloma Humano

(Vacuna contra cáncer de útero y otros)

Vacuna: Nonavalente (tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), ADN recombinante.

Dosis: 3 dosis.

Esquema: Día de inicio - 2 meses - 6 meses.

Tiempo de protección: Mayor a 5 años probablemente (hay estudios en curso).

Infecciones Neumocócicas

A. Vacuna antineumocócicas polisacárido conjugada:

constituida por 13 serotipos.

Recomendado a todas las personas a partir de los 50 años de edad. Personas jóvenes a partir de los 19 años y que adolecen afecciones crónicas (asma, diabetes mellitus, EPOC, sistema inmunológico “disminuido” por enfermedad y/o tratamientos, fumadores, etc). La vacunación previene:

- Meningitis (infección de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal).
- Neumonía (infección de los pulmones).
- Otitis media (infección del oído medio).
- Sinusitis (infección de los senos paranasales).
- Bacteriemia (bacterias en el torrente sanguíneo).
- Sepsis (una infección seria del torrente sanguíneo que puede ser mortal).

Dosis: 1 dosis.

B. Vacuna antineumocócica polisacárida capsulares:

constituidos por 23 serotipos.

Recomendado a partir de los 60 años de edad, personas con enfermedades crónicas adyacentes: diabetes mellitus, insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, esplenectomizados, enfermedades oncológicas, (pacientes con quimioterapia, radioterapia, etc). Indicado para prevenir fundamentalmente infecciones neumocócicas de tipo invasivo tales como:

- Meningitis (infección de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal).
- Bacteriemia: (bacterias en el torrente sanguíneo).
- Sepsis: (una infección seria del torrente sanguíneo que puede ser mortal).

Dosis: 1 dosis cada 3 a 5 años (se recomienda máximo dos veces, excepto situaciones médicas específicas).

Recomendación: Iniciar la vacunación con la vacuna conjugada de 13 serotipos y luego continuar con la vacuna polisacárida de 23 serotipos (el esquema dependerá de las condiciones de salud de cada paciente).

Virus del Herpes Zoster

Vacuna: Virus vivo atenuado

Indicado a partir de los 60 años de edad, incluso aún cuando ya tuvo la enfermedad para prevenir la neuritis post herpética.

Dosis: 1 dosis.

Tiempo de protección: Aprox. 05 años (continúan investigaciones sobre mayor tiempo de protección).

Recomendación: Pacientes menores de 50 años inmunosuprimidos, pueden consultar con su médico para la vacunación.

Vacunas para niños

Esquema de Vacunación

0 meses

BCG

Hepatitis viral B 1ra. dosis

2 meses

Hexavalente Acelular (Difteria, Tétanos, Pertusis, Polio, Meningitis, Hepatitis viral B)

Neumococo 13 VTE (13 serotipos de neumococo)

Rotavirus pentavalente 1ra. Dosis

4 meses

Hexavalente Acelular (Difteria, Tétanos, Pertusis, Polio, Meningitis, Hepatitis viral B)

Neumococo 13 VTE (13 serotipos de neumococo)

Rotavirus pentavalente 2da. dosis

6 meses

Hexavalente Acelular (Difteria, Tétanos, Pertusis, Polio, Meningitis, Hepatitis viral B)

Neumococo 13 VTE (13 serotipos de neumococo)

Rotavirus pentavalente 3ra. dosis

7 meses

Vacuna contra la influenza (1ra dosis)

8 meses

Vacuna contra la influenza (2da dosis)

12 meses

Varicela

Trivírica (Rubéola, Paperas, Sarampión)

15 meses

Neumococo 13 VTE (13 serotipos de neumococo). Refuerzo.

Fiebre Amarilla

Hepatitis viral A 1ra. dosis

18 meses

Hexavalente Acelular (Difteria, Tétanos, Pertusis, Polio, Meningitis, Hepatitis viral B) Refuerzo.

24 meses

Hepatitis viral A 2da. dosis

4 - 6 años

Tetavalente Acelular (Difteria, Tétanos, Pertusis y Polio): Refuerzo.

Tetravírica (Rubéola/Paperas/Sarampión/Varicela): Refuerzo

10 años

Difteria / Tétanos / Pertusis (DTPa)

Polio

Trivírica

VPH (Virus del Papiloma Humano).

Esquema: 03 dosis: 0 - 2 - 6 meses (mayores de 15 años).

02 dosis: 0 - 6 meses (de 10 a 14 años).

Vacunas opcionales

- Vacuna contra Neumococo (23 serotipos), a partir de los 2 años de edad en pacientes inmunosuprimidos.
- Vacuna contra Tifoidea, a partir de los 2 años de edad.
- Vacuna contra la Rabia, de acuerdo a esquemas de pre o post exposición.
- Vacuna Hepatitis A y B (doble), a partir de 1 año (2 dosis con intervalo de 6 meses).
- Vacuna contra Meningitis tipo A+C+Y+W135, a partir de los 9 meses.

Recomendaciones OMS / OPS - MINSA - PERÚ.

Recomendaciones

Si la madre gestante confirmara ser portador del virus de la hepatitis viral B, deberá comunicar al perinatólogo que atenderá al bebé inmediatamente después del nacimiento.

El cronograma de vacunaciones que recomendamos cumple con las disposiciones actuales de los reglamentos de salud de la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones (ESNI) del Ministerio de Salud del Perú y también de acuerdo a las recomendaciones del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) a nivel mundial.

Sin embargo, todo cronograma de inmunizaciones es flexible por razones de salud y los diferentes factores de riesgo a los que pueda estar expuesto el niño y/o persona.

Visite nuestras sedes

Sedes Lima

San Isidro

- Av. Dos de Mayo 1741.

Jesús María

- Av. General Garzón 944.
- **Clínica San Felipe:**
Av. Gregorio Escobedo 650.

Surco

- Av. La Encalada 435, Monterrico.
- Av. Primavera 410, Chacarilla.
- Av. Alfredo Benavides 4498
- Av. Los Próceros 1090, tienda 2, C.C. Pentamall.

La Molina

- Av. Raúl Ferrero 1075.
- Av. Los Constructores 1250.
- **Centro Médico San Felipe:**
Av. Javier Prado Este 4841, Camacho.

Miraflores

- Av. Comandante Espinar 407.
- Av. Armendáriz 500.

Magdalena del Mar

- Jr. Tomás Ramsey 1075.

San Borja

- Av. Guardia Civil 711, Córpac.

San Miguel

- Av. La Marina 1023.

Los Olivos

- Av. Carlos Alberto Izaguirre 1278.
- Av. Alfredo Mendiola F-25, cuadra 77, Urb. Pro.

Chorrillos

- Prolongación Ariosto Matellini 287, tienda 3, C.C. Strip Center Matellini.

Sedes Arequipa

Yanahuara

- Calle Emmel 119, Yanahuara (entre las cuadras 1 y 2 de Av. Ejército).

Lambramani

- Av. Lambramani 325, 1er nivel, C.C. Parque Lambramani.

Servicio de vacunación no disponible en las sedes Matellini, Pro, Ramsey y Lambramani.

Horario de atención

Sedes Lima

Lunes a viernes: 07:00 a 18:30.
Sábados: 07:00 a 12:00.

• **Sede Centro Médico San Felipe:**

Lunes a sábados: 06:30 a 22:00.
Domingos y feriados: 07:00 a 22:00.

Horarios Especiales

• **Sede Clínica San Felipe:**
24 horas, los 365 días del año.

• **Sedes Raúl Ferrero, Encalada, San Borja, Espinar y Benavides:**
Lunes a viernes: 06:30 a 18:30.
Sábados: 06:30 a 12:00.

Sedes Arequipa

• **Sede Yanahuara:**
Lunes a viernes: 07:00 a 20:00.
Sábados: 07:00 a 13:00.

• **Sede Lambramani:**
Lunes a viernes: 07:00 a 18:30.
Sábados: 07:00 a 12:00.

 **Atención telefónica las 24 horas**
Lima (01) 513 6666 - Arequipa (054) 272 273

Consulte sus resultados en: www.labroe.com

Encuétranos en  laboratoriosroe

Consulte sus resultados en:
www.labroe.com

 Atención telefónica
las 24 horas del día

Lima (01) 513 6666

Arequipa (054) 272 273

correo@labroe.com



 ISO 9001